

SSP 59: Diarrhoea

Definition: Eine Diarrhö besteht bei mehr als 3 ungeformten Stühlen täglich mit Wassergehalt > 75 % oder Stuhlmasse > 250 g/d. Man unterscheidet akute Diarrhö (bis 14 Tage) und chronische Diarrhö (> 14 Tage). Die Ursachen sind vielfältig.

Häufige Differentialdiagnosen

1, 6, 8 Akute infektiöse und parasitäre Diarrhö

6 Nahrungsmittelintoxikation

6 Nebenwirkung von Medikamenten

6 Laktasemangel

6, 13, 16, 5 Zöliakie

6, 5 Morbus Crohn

6, 5 Colitis Ulcerosa

6 Inkontinenz

6 Diarrhödominantestes Reizdarmsyndrom

Seltene Differentialdiagnosen

6 Pseudomembranöse Kolitis

6 Exogene Toxine

6 Nahrungsmittelallergien

6 Gallensäureverlustsyndrom

Intestinale Lymphangiektasie

6 Bakterielle Überwucherung

6, 5 Morbus Whipple

13 Verner-Morrison-Syndrom

6, 13 Dünndarmkarzinoid


6 Ischämische (Entero-)Kolitis ▲


6 Kolonkarzinom

10 Angststörung

13 Hyperthyreose

Legende

 Gastrointestinal

 Funktionell

 Schnelles Handeln nötig

1 TB Grundlagen der Diagnostik und Therapie

2 TB Atmung

3 TB Herz-Kreislauf

4 TB Psychosoziale Medizin II

5 TB Bewegungsapparat

6 TB Gastrointestinaltrakt

7 TB Infekt, Abwehr, Systemerkrankungen

8 TB Global and Public Health

9 TB Geschlechtsorgane

10 TB Psyche und Verhalten

11 TB Sinnesorgane, Gesicht, Hals

12 TB Nervensystem

13 TB Stoffwechsel, endokrine Organe

14 TB Schwangerschaft, Geburt

15 TB Haut

16 TB Kinder- und Jugendmedizin

17 TB Rechtsmedizin

18 TB Niere, Elektrolyte, Wasserhaushalt

19 TB Hämatologische Neoplasien

20 TB Anästhesiologie, perioperative Medizin

21 TB Notfälle